

بررسی شیوع و اثر متغیرهای جمعیتی روی پترزیوم و پینگکولا در جمعیت روستایی شهرستان سبزوار طی سال‌های ۱۳۸۱-۸۳

دکتر ابراهیم شیرزاده^۱، دکتر علی اکبر بلوریان^۲

^۱ دانشیار چشم پزشکی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

^۲ استادیار چشم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نشانی نویسنده مسؤول: سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی سبزوار، دکتر ابراهیم شیرزاده

E-mail: dreshirzad@yahoo.com

وصول: ۸۶/۳/۱۲، ۸۶/۵/۲۸، اصلاح، پذیرش: ۸۶/۶/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: پینگکولا بر زیبایی اثر گذاشت و در برخی موارد باعث پترزیوم می‌شود. سوزش، تحریک، آبریزش و احساس جسم خارجی در چشم، گاهی ایجاد آستینگماتیسم قابل توجه در قرنیه و ایجاد کاهش بینایی از نشانه‌های اصلی ایجاد شده به وسیله پترزیوم می‌باشند. با توجه به این که بیشتر داده‌های موجود در مورد پترزیوم و پینگکولا بر اساس مطالعات یمارستانی است، هدف از این مطالعه بررسی شیوع و اثر متغیرهای جمعیتی روی شیوع پترزیوم و پینگکولا در نواحی روستایی شهرستان سبزوار می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی اپیدمیولوژی و مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه کسانی است که در روستاهای سبزوار اقامت داشتند. نمونه‌گیری از نوع خوش‌های بوده که به‌طور تصادفی از چهل روستای سبزوار (خوش) انتخاب شده‌اند. حجم نمونه ۲۰۰۸ نفر می‌باشد و زمان مطالعه طی سال‌های ۱۳۸۱-۸۳ بود. افراد مورد مطالعه تحت مصاحبه و معاینه کامل چشم پزشکی قرار گرفتند. تشخیص پترزیوم و پینگکولا به صورت کلینیکی بود. ارتباط بین اثر متغیرهای جمعیتی و پترزیوم و پینگکولا مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون‌های مورد استفاده عبارت بودند از آزمون مجدور کای، آزمون تی و آزمون رگرسیون لوجستیک.

یافته‌ها: متوسط سن ۱۰۱۴ نفر مرد (۴۰/۵ درصد) و ۱۴۹۴ زن (۵۹/۵ درصد) مورد مطالعه به ترتیب $\pm ۰/۰۵$ سال و $\pm ۰/۰۷$ سال و $\pm ۰/۰۵$ سال بود. از ۲۵۰۸ نفر معاينه شده، ۳۹۶ مورد دارای پترزیوم و پینگکولا بودند. شیوع کلی توأم آن‌ها ۱۵/۸ درصد به‌دست آمد. شیوع جنسیتی شامل ۱۸۷ نفر مرد (۱۸/۴۴ درصد) و ۲۰۹ زن (۱۴ درصد) بود. شیوع در مردان بالاتر از زنان بود. توزیع پترزیوم و پینگکولا در چشم‌ها غیرقرینه (آسیمتریک) بود به‌طوری که نسبت پترزیوم و پینگکولای چشم راست به چشم چپ $۰/۶۴$ به دست آمد. توزیع پترزیوم و پینگکولا بر اساس شغل نشان داد که کشاورزان، کارگران و افراد خانه‌دار به ترتیب بیشترین شیوع را به صورت زیر داشتند: ۳۹/۵ درصد، ۳۳/۳ درصد و ۲۳ درصد.

نتیجه‌گیری: شیوع کلی پترزیوم و پینگکولا در جمعیت روستایی سبزوار ۱۵/۸ درصد است. این ممکن است مربوط به نقش فاکتورهای خطر متغیرهای جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و نزدی و فامیلیا باشد. (مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۴/شماره ۳ / صص ۱۱۴-۱۷۹).

واژه‌های کلیدی: شیوع؛ فاکتورهای انسانی؛ پترزیوم؛ پینگکولا؛ سبزوار.

مقدمه

جامعه آماری شامل کلیه کسانی است که در روستاهای سبزوار اقامت داشتند. نمونه‌ها به صورت تصادفی و خوشهای با توجه به درصد جمعیت روستایی شهرستان سبزوار و تعداد مراکر بهداشتی درمانی روستایی و خانه‌های بهداشتی و روستاهای قمر تحت پوشش از افراد ساکن در چهل روستا (خوشه) از توابع شهرستان سبزوار انتخاب شدند. زمان مطالعه بین فروردین ماه ۱۳۸۱ تا فروردین ماه ۱۳۸۳ بود.

۲۵۰۸ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که افراد مورد مطالعه ابتدا توسط یک نفر بینایی‌سنج و پزشک عمومی در هر خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی روستایی غربالگری اولیه شدند. افراد مشکوک به پترزیوم و پینگکولا برای معاینه کامل چشم پزشکی به یک متخصص چشم ارجاع می‌شدند. از نظر کلینیکی پینگکولا به صورت یک توده بیضوی شکل، مختصری برجسته، سفید مایل به زرد از بافت ملتجمه بولبر بوده که در هر طرف قرنیه قرار گرفته و پترزیوم به صورت بافت فیبروواسکولار گوهای شکل از بافت ملتجمه که بر روی قرنیه در یک یا هر دو چشم کشیده شده است، تعریف گردیدند.

شیوع پترزیوم و پینگکولا تخمین زده شد و ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و پترزیوم و پینگکولا مورد ارزیابی قرار گرفت. از آن جایی که این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی بوده و معاینه رایگان بود، هیچ-گونه پیامد اخلاقی و قانونی وجود نداشت. همه افراد از مطالعه آگاه بودند و از افراد مورد مطالعه یا والدین شان و همچنین سیاست‌گذاران محلی مثل افراد شورای اسلامی روستا کسب اجازه شده بود. محدودیت مطالعه شامل عدم حضور برخی از افراد در خوشه‌ها بود که بیشتر آن‌ها را سربازان و دانشجویان تشکیل داده و در شهرهای دیگر بودند و یا کسانی بودند که در خارج از محل زندگی کار می‌کردند. آنالیز آماری به وسیله کامپیوتر با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. آزمون‌های مورد مطالعه عبارت بودند از مجدد کای، تی تست و مدل رگرسیون لوچستیک.

پترزیوم یک بافت گوهای شکل فیبروواسکولار مشخص از ملتجمه است که قرنیه را بین اپیتلیوم و لایه بومن در محل رأسش مورد تهاجم قرار می‌دهد. اغلب در فضای بین پلکی رخ می‌دهد و در طرف نازال نسبت به طرف تمپورال شایع‌تر است (۱-۳). پینگکولا یک بافت دژنراتیو از ملتجمه بولبر است که به صورت یک توده سفید مایل به زرد مختصراً برجسته، بیضوی شکل در هر طرف قرنیه در ناحیه بین پلکی مشاهده می‌شود. این ضایعه معمولاً دو طرفه است و در ناحیه نازال واقع است. پینگکولا باعث اثر بر زیبایی و در برخی موارد باعث پترزیوم می‌شود (۴). نشانه‌های اصلی ایجاد شده به وسیله پترزیوم عبارتند از سوزش، تحریک، آبریزش و احساس جسم خارجی در چشم‌ها. پترزیوم ممکن است باعث آستیگماتیسم قابل توجه در قرنیه شده و ایجاد کاهش بینایی نماید. در موارد نادر ممکن است سیمبلغارون تشکیل شده و منجر به محدودیت در حرکات چشم و ایجاد دیپلوپی نماید (۱).

بیشتر داده‌های موجود در مورد پترزیوم و پینگکولا بر اساس مطالعات بیمارستانی است (Study). اما مطالعه ما یک بررسی جمعیتی (Hospital Based Population Based Study) است و هدف از این مطالعه بررسی اثر فاکتورهای جمعیتی از قبیل سن، جنس و سطح تحصیلات و شغل روی شیوع پترزیوم و پینگکولا در نواحی روستایی شهرستان سبزوار است. سبزوار با ۲۱۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت و بیش از ۴۴۵۰۰ نفر جمعیت دومین شهر بزرگ خراسان رضوی بعد از مشهد مقدس است. حدود ۵۱/۱ درصد جمعیت این شهرستان ساکن روستا بوده و مطالعه شامل کسانی است که در روستا اقامت داشتند.

مواد و روش‌ها

نوع مطالعه توصیفی اپیدمیولوژی و مقطعی است.

یافته‌ها

متوسط سن ۱۰۱۴ نفر مرد (۴۰/۵ درصد) $\pm 22/07 \pm 27/84$ سال بود (دامنه سنی ۳ روز تا ۸۴ سال و میانه ۱۸ سال) و متوسط سن ۱۴۹۴ نفر زن (۵۹/۵ درصد) $\pm 19/05 \pm 26/90$ سال بود (دامنه سنی ۳ روز تا ۹۲ سال و میانه ۲۱ سال). آزمون آماری تی نشان داد که از نظر آماری این اختلاف سنی معنی‌دار نیست. از ۲۵۰۸ نفر مورد مطالعه، ۳۹۶ نفرشان مبتلا به پترژیوم و پینگکولا بودند که شیوع کلی آن‌ها شامل ۱۵/۸ درصد بود. از نظر شیوع جنسیتی شامل ۱۸۷ نفر مرد (۱۸/۴۴ درصد) و ۲۰۹ زن (۱۴ درصد) بود.

با همگن کردن سن نسبت شانس ابتلا به پترژیوم و پینگکولا در مردان نسبت به زنان ۱/۲۸ بود. متوسط سن ۳۹۶ نفر مبتلا به پترژیوم و پینگکولا و ۲۱۰۱ مورد بدون $\pm 18/84 \pm 23/60 \pm 46/60$ سال و $\pm 23/65$ سال بود. آزمون آماری تی نشان داد که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار است.

افراد دارای سن بین ۳۱ تا ۹۲ سال با ۳۶/۶ درصد بیشترین شیوع را داشته‌اند و نسبت شانس ابتلا به پترژیوم و پینگکولا در آن‌ها نسبت به سایر گروه‌های سنی برابر ۱۳/۳ به‌دست آمد. همچنین شیوع پترژیوم و پینگکولا، با افزایش سن به صورت خطی افزایش داشت (جدول ۱).

توزیع پترژیوم و پینگکولا بر اساس سطح تحصیلات نشان داد که افراد بی‌سواد بیشترین تعداد مبتلایان را تشکیل می‌دادند و شیوع در آن‌ها با ۲۳/۴ درصد بیشترین بود (جدول ۲). نسبت شانس ابتلا به پترژیوم و پینگکولا در افراد بی‌سواد نسبت به سایر سطوح آموزشی بر اساس همگن کردن سن برابر ۱۰/۵ بود.

همچنین توزیع پترژیوم و پینگکولا بر اساس شغل نشان داد که کشاورزان، کارگران و افراد خانه‌دار به ترتیب ۳۹/۳ ذیل دارای بیشترین شیوع بودند: ۳۹/۵ درصد، ۲۳/۳ درصد و ۲۳ درصد. آزمون آماری مجدول کای نشان داد

جدول ۱: شیوع پترژیوم و پینگکولا بر اساس گروه‌های سنی (سال)

۱۰۰(۱۰۰)	۰/۰(۰/۰)	۲۵۰(۱۰۰/۰)	≤ ۴
۶۸۷(۱۰۰)	۱۰(۱/۵)	۶۷۷(۹۸/۵)	۶-۱۵
۶۶۱(۱۰۰)	۶۵(۸/۵)	۶۰۵(۹۱/۵)	۱۶-۳۰
۳۹۶(۱۰۰)	۱۳۵(۳۴/۱)	۲۶۱(۶۵/۹)	۳۱-۴۵
۴۲۳(۱۰۰)	۱۵۹(۳۷/۶)	۲۶۴(۶۲/۴)	۴۶-۷۰
۷۹(۱۰۰)	۳۵(۴۴/۳)	۴۴(۵۵/۷)	۷۱-۹۲
۲۴۹۶(۱۰۰)	۳۹۵(۱۵/۸)	۲۱۰(۸۴/۲)	مجموع کل

جدول ۲: شیوع پترژیوم و پینگکولا بر اساس سطح علمی میزان تحصیلات

۱۰۰(۱۰۰)	۲۲۶(۲۳/۴)	۷۴۱(۷۶/۶)	پیساد
۸۴۷(۱۰۰)	۱۰۸(۱۲/۸)	۷۳۹(۸۷/۷)	ابتدایی
۶۰۷(۱۰۰)	۴۵(۷/۴)	۵۶۲(۹۲/۶)	راهنمایی- متوسطه
۱۳(۱۰۰)	۱(۷/۷)	۱۲(۹۲/۳)	دانشگاهی
۷۴(۱۰۰)	۱۶(۲۱/۶)	۵۸(۷۸/۴)	نامشخص
۲۵۰۸(۱۰۰)	۳۹۶(۱۵/۸)	۲۱۱۲(۷۸/۴)	مجموع کل

جدول ۳: شیوع پترژیوم و پینگکولا بر اساس شغل

۱۰۰(۱۰۰)	۲(۰/۶)	۳۲۱(۹۹/۴)	قبل از دبستان
۷۶۴(۱۰۰)	۱۷۶(۲۳/۰)	۵۸۸(۷۷/۰)	خانه دار
۶۴۰۵(۱۰۰)	۱۶۰(۳۹/۵)	۲۴۵(۶۰/۵)	کشاورز
۷۲۰(۱۰۰)	۱۵(۳/۱)	۷۰۵(۷۹/۹)	دانشآموز و دانشجو
۹۰(۱۰۰)	۳(۳/۳)	۸۷(۹۶/۷)	قالبیاف
۳۹(۱۰۰)	۷(۱۷/۹)	۳۲(۸۲/۱)	بیکار
۲۴(۱۰۰)	۸(۳۳/۳)	۱۶(۶۶/۷)	کارگر
۱۴۱(۱۰۰)	۲۴(۱۷/۰)	۱۱۷(۸۳/۰)	غیره
۲۵۰۶(۱۰۰)	۳۹۵(۱۵/۸)	۲۱۱۱(۸۴/۲)	مجموع کل

که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار است (جدول ۳).

این مطالعه نشان داد که شیوع پترژیوم و پینگکولا به طور جدایگانه به ترتیب ۱۲/۸ درصد و ۲/۴ درصد بود

شانس ابتلا به پترزیوم و پینگکولا در مردان نسبت به زنان برابر $1/28$ به دست آمد و این یافته مشابه مطالعه سنگاپور است. بنابراین به نظر می‌رسد که جنسیت یک فاکتور خطر باشد و شاید عوامل دیگر مثل کارکردن بیشتر مردان در محیط‌های روتایی در بیرون از خانه و نقش اشعة ماوراء بدنخش در افزایش شیوع در مردان دخیل باشد. گزارش شده است که تشکیل پترزیوم وابسته به میزان اشعه ماوراء بدنخش است و اشعه ماوراء بدنخش اساساً

ولی شیوع توانم این دو با هم یک درصد بود. همچنین شیوع پترزیوم و پینگکولا در ناحیه نازال شایع‌تر بود به طوری که پترزیوم نازال دو چشمی 175 (7 درصد) و در چشم چپ 61 ($2/4$ درصد)، چشم راست 38 ($1/5$ درصد) و در حالت دو چشمی 45 ($1/8$ درصد) بود. توزیع پترزیوم در چشم‌ها غیرقیرینه (آسمتریک) بود و نسبت آن در چشم راست به چپ $0/64$ به دست آمد (جدول ۴).

جدول ۴: شیوع پترزیوم و پینگکولا بر اساس محل ایجاد در چشم‌ها

کل (درصد) تعداد	توام پترزیومو پینگکولا (درصد) تعداد	دوچشمی		چپ تعداد (درصد)	راست تعداد (درصد)	مخلط تعداد (درصد)	دوچشمی		چپ تعداد (درصد)	راست تعداد (درصد)	پترزیوم و پینگکولا نازال
		دوچشمی تعداد (درصد) تعداد	دوچشمی تعداد (درصد) تعداد				دوچشمی تعداد (درصد) تعداد	دوچشمی تعداد (درصد) تعداد			
		محل اختلال چشمی									
۳۴۸(۱۳/۹)	۱۴(۰/۶)	۴۵(۱/۸)	۹(۰/۴)	۶(۰/۲)	-	۱۷۵(۷)	۶۱(۲/۴)	۳۸(۱/۵)	۳۸(۱/۵)	۳۸(۱/۵)	نازال
۱۸(۰/۸)	-	-	-	-	-	۷(۰/۳)	۷(۰/۳)	۴(۰/۲)	۴(۰/۲)	۴(۰/۲)	تمپورال
۲۷(۱/۱)	-	-	-	-	-	۹(۰/۴)	۱۳(۰/۵)	۲(۰/۱)	۳(۰/۱)	۳(۰/۱)	توأم نازال و تمپورال
۳۹۳(۱۵/۸)	۱۴(۰/۶)	۴۵(۱/۸)	۹(۰/۴)	۶(۰/۲)	۹(۰/۴)	۱۹۵(۷/۸)	۷۰(۲/۸)	۴۵(۱/۸)	۴۵(۱/۸)	۴۵(۱/۸)	جمع کل

ایجاد ضایعاتی در DNA سلول می‌نماید که نتیجه آن ایجاد موتاسیون در ژن $P53$ می‌باشد که یک ژن سرکوب-کننده تومور است. موتاسیون در ژن $P53$ در اپیتلیوم برخی از پترزیوم‌ها گزارش شده است (۶). بنابراین در محیط‌های روتایی که تماس با اشعه ماوراء بدنخش، به ویژه در مورد مردان، زیاد است انتظار می‌رود که شیوع پترزیوم در مردان بیش از زنان باشد. طبق گزارش، شیوع پترزیوم در سنگاپور در بین افراد چینی 40 سال و بالاتر درصد است اما شیوع پترزیوم تنها در جمعیت روتایی سبزوار $12/8$ درصد بود که این ممکن است در اثر آب و هوای گرم و نسبتاً خشک سبزوار در مقایسه با سنگاپور یا تفاوت نژاد و شغل در دو جمعیت باشد.

همچنین بررسی شیوع پترزیوم در استان هانیان چین نشان داد که از بین 7990 نفر روتایی معاینه شده، $7/86$ مورد مبتلا به پترزیوم بودند و شیوع کلی آن $7/86$ درصد بوده و در مردان کمتر از زنان است (۷). برخلاف نتایج برخی از مطالعات، از جمله مطالعه حاضر، که پترزیوم در مردان شایع‌تر از زنان است، مطالعه گازارد و

بحث در این مطالعه نتایج نشان داد که از 2508 نفر معاینه شده، 396 نفر مبتلا به پترزیوم و پینگکولا بودند و شیوع کلی $15/8$ درصد بود. اما شیوع پترزیوم و پینگکولا به طور مجزا به ترتیب $12/8$ درصد (322 نفر) و $2/4$ درصد (60 نفر) به دست آمد.

چون که بیشتر داده‌های موجود در مورد توزیع پترزیوم از مطالعات بیمارستان است، برخی گزارش‌ها شیوع آن را حدود 31 درصد مثلاً در مورد (افراد مراجعه کرده به بیمارستان لیما در پرو) ذکر کرده‌اند (۱). در مطالعه انجام گرفته به وسیله وانگ و همکاران برای مشخص کردن شیوع و فاکتورهای خطر پترزیوم در جمعیت چینی سنگاپور در افراد با سن 40 سال و بالاتر نشان داد که از بین 1232 نفر معاینه شده، 120 نفر مبتلا به پترزیوم بودند که 70 نفرشان یک طرفه و 50 نفرشان دو طرفه بودند و شیوع کلی آن $6/9$ درصد بود (۵).

این مطالعه نشان داد که شیوع پترزیوم و پینگکولا در مردان بیشتر از زنان است و با همگن کردن سن نسبت

طرفه پتربیوم به طور کلی ۴/۱ درصد بود ولی ما دریافتیم که شیوع پتربیوم و پینگکولا در ناحیه نازال شایع‌تر است ولی شیوع دو طرفه در ناحیه نازال برای پتربیوم ۷ درصد (۱۷۵ نفر) و برای پینگکولا ۱/۸ درصد (۴۵ نفر) بود.

پراکندگی پتربیوم و پینگکولا بر اساس میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه نشان داد که افراد بی‌ساد دارای بیشترین فراوانی بوده و بیشترین شیوع در آن‌ها بود که این می‌تواند بیانگر نقش غیر مستقیم سطح سواد کم روی بروز پتربیوم و پینگکولا باشد چون‌که بیشتر آن‌ها در محیط خارج از مکان‌های سرپوشیده کار می‌کنند و بیشتر افراد بی‌ساد در محیط‌های روزتایی شهرستان سبزوار با نور خورشید در تماس هستند.

همچنین این مطالعه نشان داد که شیوع این دو اختلال به‌طور خطی با افزایش سن افزایش یافت و افراد بیش از ۳۱ سال بیشترین شیوع را داشتند.

در مطالعه‌ای در ایالت اوگان نیجریه برای تعیین شیوع و علت نایابی و بینایی کم نشان داد که پتربیوم یکی از علل اصلی اختلال بینایی است و مسؤول ۱۹/۵ درصد موارد دو طرفه و ۲۳/۰۸ درصد موارد یک طرفه اختلال بینایی بود (۱۰). بنابراین تعیین شیوع و شناخت اثر متغیرهای جمعیتی روی پتربیوم و پینگکولا می‌تواند مفید باشد.

به طور کلی، شیوع کلی پتربیوم و پینگکولا در جمعیت روزتایی سبزوار ۱۵/۸ درصد است. این ممکن است مربوط به فاکتورهای خطر انسانی، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و نژادی و فامیلیال باشد. لذا اقدامات پیشگیرانه از قبیل استفاده از عینک آفتابی و آموزش بهداشت می‌تواند در پیشگیری از بروز بسیاری از مشکلات زیبایی، اختلال بینایی و کاهش هزینه درمان ناشی از این اختلالات مؤثر باشد.

تشکر و قدرانی

محققین از شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار به خاطر تصویب طرح تحقیقاتی و همه

همکاران (۸) در اندونزی نشان داد که تفاوت از نظر جنسیتی وجود ندارد. پس غیر از جنسیت عوامل دیگری باشیست روی بروز و شیوع پتربیوم به عنوان فاکتورهای خطر مؤثر باشند که شاید علت این اختلاف واریاسیون در بین جمعیت مورد مطالعه از نظر تعداد، فعالیت خارج از منزل و میزان تماس با نور خورشید در دو جنس باشد. ولی مقایسه مستقیم شیوع بین مطالعات باشیست به دلیل تفاوت جمعیت مورد مطالعه، تکنیک‌های اندازه‌گیری و روش مطالعه، با احتیاط صورت پذیرد (۸). در یک مطالعه انجام گرفته برای بررسی اثر نور خورشید روی پتربیوم و پینگکولا بین افراد پستچی در مرکز تایوان نشان داد که شیوع پینگکولا و پتربیوم به ترتیب ۶۲/۹ درصد و ۷/۳ درصد بود. ماهیت کاری پست در محیط خارج به‌طور قابل ملاحظه‌ای با وقوع پینگکولا به علاوه پتربیوم همراه بود و یافته‌ها دلالت بر این داشت که اختلالات ملتحمه با اثر شغلی افراد پستچی به خاطر تماس با نور خورشید در محیط بیرون همراه بودند (۹).

در این مطالعه نیز توزیع پتربیوم و پینگکولا بر اساس شغل نشان داد که کشاورزان، کارگران و افراد خانه‌دار به ترتیب بیشترین شیوع را داشته‌اند (یعنی ۳۹/۵ درصد، ۲۳/۳ درصد و ۲۳ درصد) که با همگن کردن سن و جنس نسبت شانس ابتلا به پتربیوم و پینگکولا در کشاورزان نسبت به سایر شغل‌ها بیشترین یعنی ۲/۴ درصد و در دانش آموزان و دانشجویان نسبت به سایر شغل‌ها کمترین یعنی ۰/۱۵ درصد بود. از آنجایی که کشاورزان و کارگران و افراد خانه‌دار در مناطق روزتایی در خارج از منزل کار می‌کنند، بنابراین عاملی که می‌تواند در بروز پتربیوم و پینگکولا مؤثر باشد تماس با نور خورشید در اثر وظایف شغلی است.

در این مطالعه فراوانی اشکال دو طرفه یا یک طرفه پتربیوم و پینگکولا به ترتیب ۱۹۵ (۷/۸ درصد)، ۴۵ نفر (۱/۸ درصد)، ۱۱۵ (۴/۶ درصد) و ۱۵ نفر (۰/۶ درصد) بود، اما در مطالعه گازارد و همکاران شیوع دو

کمک در آنالیز آماری تشکر می‌نمایند.

کسانی که در به ثمر رساندن آن نقش داشته‌اند به‌ویژه آقای نیکپور و همچنین از آقای دکتر اسماعیلی به‌خاطر

References

1. Gordon JJ, Darwin C M, Robert W . The epidemiology of eye diseases.1st ed. London: Chapman and Hall Medical; 1998
2. Broadway DC, Tufail A, Khaw PT. Ophthalmology: Examination Techniques, Questions and Answers. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1999. p. 73.
3. Lindsay RG, Sullivan L.case report pterygium-induced corneal astigmatism .Clin Exp Optom. 2001;84(4):200-203.
4. Newell FW.Ophthalmology principles and concepts. St.Louis : Mosby; 1986. p. 377.
5. Wong TY, Foster PJ, Johnson GJ, Seah SKL, Tan DTH. The prevalence and risk factors for pterygium in an adult Chinese population in Singapore: the Tanjong Pagar survey. Am J Ophthalmol. 2001;131(2):176-83
6. Tsai YY, Cheng YW, Lee H, Tsai FJ, Tseng SH, Chang KC. P53 gene mutation spectrum and the relationship between gene mutation and protein levels in pterygium. Mol Vis. 2005 ;11:50-5.
7. Liu H, Yang J, Zhong L.Prevalence survey on pterygium in two counties of Hainan Province. Zhonghua Yan Ke Za Zhi- Jan. 2001;37(1): 21-3.
8. Gazzard G, Saw S-M , Farook M, Koh D, Widjaja D, Chia S-E, et al. Pterygium in Indonesia: prevalence, severity and risk factors. Br J Ophthalmol. 2002;86(12):1341-6
9. Tang FC, Chen SC, Lee HS, Lin WF, Chou MC, Lee MC. Relationship between pterygium/pinguecula and sunlight exposure among postmen in central Taiwan. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 1999; 62(8): 496-502.
10. Fasina F O, Ajaiyeoba A I. The prevalence and cause of blindness and low vision in Ogun state, Nigeria. Afr J Biomed Res. 2003; 6(2): 63-67.